



Pecora nera/bruna di montagna

1 Origine della razza

La pecora nera/bruna di montagna è una razza svizzera molto antica, già menzionata nel XIV secolo. Ebbe origine da diversi ceppi autoctoni regionali. La standardizzazione della razza è stata completata nel XX secolo. I progressi zootecnici furono ottenuti senza effettuare incroci con altre razze. La selezione costante ha permesso di ottenere una razza precoce e molto fertile. Inizialmente veniva utilizzata per produrre lana scura, fine e di alta qualità. La prima descrizione ufficiale della razza risale al 1925.

Grazie all'elevato livello di eterosi, questa razza è particolarmente indicata per gli incroci industriali.



2 Breve descrizione

La pecora nera/bruna di montagna è vivace, di medie dimensioni e molto fertile. Come suggerisce il nome, viene allevata nei colori nero o marrone. Ha una costituzione robusta e solida, è resistente in condizioni di alimentazione e di allevamento moderate, è adatta all'alpeggio e stanziale. Il corpo è armonioso, basso, di buona corporatura e con marcati caratteri sessuali (mammelle, testicoli).

Testa: senza corna, di media lunghezza, con bocca larga e linea del naso rettilinea (consigliata soprattutto per le femmine); orecchie di lunghezza media e orizzontali; testa e gambe senza lana, a seconda del colore pelo nero o marrone lucido.

Questa razza è stata costantemente migliorata per l'allevamento mediante la destagionalità, le buone caratteristiche materne, l'ottima produzione di latte e carne (T-H) e la finezza della lana. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, è molto apprezzata in Svizzera e all'estero per gli incroci industriali.

3 Obiettivo zootecnico

- Mantenimento e promozione della salute
- Mantenimento e miglioramento della resistenza e dell'adattabilità in montagna
- Elevata capacità di adattamento, valorizzazione ottimale del foraggio al pascolo
- Promozione dell'uso efficiente delle risorse
- Longevità con una durata media di produzione di 6 anni
- Crescita veloce e buona attitudine all'ingrasso, elevata capacità di crescita degli agnelli, agnelli di buona qualità al momento della macellazione (da latte), carnosità media (almeno T)
- Buon istinto materno, elevata produzione di latte, precoce, raggiunge la maturità sessuale a 10 mesi
- Senza corna
- Vello senza imperfezioni, finezza della lana 2-3, lunghezza di 3 cm in 180 giorni
- Gli obiettivi di allevamento devono essere raggiunti in modo naturale mediante selezione/allevamento.

4 Carattere

La pecora nera/bruna di montagna è vivace, adatta all'alpeggio, molto economica e ideale per allevamenti estensivi.

5 Riproduzione

5.1 Agnellatura

Attività riproduttiva non stagionale. Il primo accoppiamento avviene tra i 15 e i 18 mesi, il che rende la pecora nera/bruna di montagna la razza più fertile della Svizzera.

5.2 Prolificità (valore genetico)

1,5 agnelli per figliata con un intervallo di 290 giorni; 2,2 agnelli nati per pecora all'anno.



6 Valutazione esterna

6.1 Tipo (formato)

Corpo armonioso, robust, con un buon accrescimento, caratteri sessuali spiccati; mammelle sane.

6.1.1 Caratteristiche di colore

Colori nero o marrone

6.1.2 Testa e collo

- Testa medio-lunga
- Bocca larga
- Dentatura sovrapposta o adiacente
- Viene preferita una linea del naso rettilinea (soprattutto nelle femmine)
- Testa e gambe senza lana, del colore pelo nero o marrone lucido
- Orecchie medio-lunghe e portate orizzontalmente
- Collo muscoloso

6.1.3 Petto, spalle

- Petto breit, largo, con buona arcatura del costato
- Spalle aderenti

6.1.4 Garrese

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 66 - 80 cm ♂ 75 - 90 cm
Garrese ampio e chiuso

6.1.5 Schiena, bacino, lombi, fianchi

- Schiena larga con linea superiore diritta
- Lombi larghi, forti e ben muscolosi
- Buona profondità dei fianchi
- Lunghezza media del bacino, largo e poco cadente
- Coscia con muscolatura uniforme

6.1.6 Peso

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 70 - 95 kg ♂ 90 - 120 kg

6.2 Fondamento

6.2.1 Arti

- Arti asciutti, piatti, non troppo fini
- Ben posizionati e senza lana

6.2.2 Posizione / postura

- Gambe posteriori posizionate correttamente, non a forma di "x" o di "o"
- Gambe anteriori ben separate, non a forma di "x"
- Garretti leggermente arcuati
- Pastorali di lunghezza media, ben sorretti
- Zoccoli scuri, duri e leggermente divaricati

6.2.3 Andatura

- Corretta, diritta (senza torsioni)
- Leggermente molleggiata

6.3 Lana

6.3.1 Lana / vello / densità

- Limitazione: Linea dalla mammella fino all'articolazione gomito, linea orecchie-nuca e alla radice caudale
- Corpo omogeneamente coperto di lana dalla linea degli occhi fino ai ginocchi anteriori e alle pastoie
- Vello folto e uniforme, con ciocche compatte e di lunghezza uniforme
- Ciocche lunghe almeno 2,5 cm per la valutazione esterna
- Colore uniforme nero o marrone

6.3.2 Finezza

F 2–3 e più fine



6.4 Difetti

6.4.1 Senza detrazione di punti

- Testa e gambe leggermente ricoperte di lana, nei capi giovani è tollerata un po' di lana di agnello su testa e gambe
- Alcuni peli di lana bianca a partire dai 18 mesi

7 Motivi d'esclusione (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Monorchidia, testicoli disuguali per dimensioni o mancanti • Nanismo • Lunghezza mascellare disuguale, posizione della dentatura • Coda non tagliata secondo l'Ordinanza federale sulla protezione degli animali
Fondamento	<ul style="list-style-type: none"> • Pastoie logorate, posizione molto scorretta
Lana	<ul style="list-style-type: none"> • Peli ispidi • filamenti ritorti nel vello come giarra-pelo in eccesso

7.1 Specifico della razza (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

- Razza impura
- Macchie di colore diverso di grandi dimensioni sulle parti del corpo ricoperte di pelo e lana, tenendo conto dei difetti estetici
- Peli bianchi di lana nel vello
- Corna pronunciate

8 Senza valutazione

Pecore senza marca auricolare

Esposizioni-mercato intercantonali

- Animali malati e feriti come ad es.: zoppina, l'ectima contagioso, la cecità de i comsci, le malattie e lesione della mammella, le anomalie del capezzolo, le malattie veneree
- Animali con ciocche di lunghezza visibilmente non uniforme all'interno della delimitazione del vello
- gli animali con forte dimagrimento
- gli animali con forte sporcizia (grumosi)